

# VILOMIN® Cafocit

Organische Säure für die erfolgreiche Ferkelaufzucht mit System

## Einsatz:

In der Ferkelaufzucht ist der Absetztermin eine kritische Phase. Hier treffen verschiedene Faktoren zusammen, die zu vermehrt auftretenden Verdauungsstörungen bzw. zu Erkrankungen führen können:

- Futterwechsel durch Wegfall der Sauenmilch und
- Umstellung auf festes Futter (Ferkelaufzuchtfutter)
- Ein nicht vollständig entwickeltes Enzymsystem der jungen Ferkel
- Wegfall der gewohnten Umgebung der Abferkelbuch



In dieser kritischen Phase hat sich der Einsatz von organischen Säuren besonders bewährt.

## Wirkungsweise der organischen Säuren:

- Konservierende Wirkung im Futter
- pH-Wert-Absenkung im Futter
- Verringerung des Säurebindungsvermögen des Futters
- Stabilisierung der Keimflora im Magen-Darm-Trakt

## Leistung:

In Stresssituationen kann der Einsatz einer Kombination von organischen Säuren das Verdauungssystem entlasten bzw. Unterstützen. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang den Zusatz von 1 - 1,5% Vilomin® Cafocit ins Futter.

Prod.-Nr. 22700

Stand Okt. 2004 - Änderungen vorbehalten! -

Zu beziehen über:

Vormischungen - Mineralfutter - Spezialprodukte - Einzelkomponenten

**Deutsche Vilomix  
Tierernährung GmbH**  
Bahnhofstr. 30  
49434 Neuenkirchen-Vörden  
Tel.: +49 (0) 54 93/98 70 0  
Fax: +49 (0) 54 93/98 79 0  
E-Mail: info@Vilomix.com



... [www.Vilomix.com](http://www.Vilomix.com)